

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

4123 Eragrostis major
Synonymes E. MEGASTACHYA Link, E. MULTIFLORA Ascher.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle de 10-50 cm, à racine fibreuse - tiges étalées ou genouillées-ascendantes, simples ou rameuses inférieurement - feuilles glabres ou à poils épars, denticulées-tuberculeuses aux bords - gaines glabres, barbues autour de la ligule, sans panicule axillaire - panicule ovale-oblongue, assez dense, étalée, à rameaux courts, épais, solitaires ou géminés, garnis d'épillets dès la base - épillets fascicules, grands, lancéolés-oblongs, larges de 2-3 mm à fleurs densément imbriquées - glumes ovales - glumelle obtuse ou émarginée-mucronulée - caryopse subglobuleux.
Écologie Lieux sablonneux, dans le Midi et le Centre, jusqu'aux environs de Paris ; Corse.
Répartition Europe ; Asie ; Afrique ; Amérique.
Floraison Juin-octobre.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : cosmopolite(thermo)	
Inflorescence : panicule d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : vert Floraison : de juin à octobre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : anémogame Dissémination : anémochore

Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol




Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **1 septembre 1850**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch. [1907: Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. Wien, sér. 2, 5 : 110]Basionyme : *Poa cilianensis* All. [1785, Fl. Pedem., 2 : 246]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

Nom sélectionné

Autres

- Numéro du type : 50407