

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|--|
| 126 Papaver rhoeas L. Coquelicot |
| <ul style="list-style-type: none"> - . Plante annuelle, velue-hérissée - tige de 20-60 cm, dressée, rameuse - feuilles pennatifides, à segments lancéolés-aigus, incisés-dentés, les caulinaires sessiles, à segment terminal très développé - pédoncules à poils très étalés - fleurs d'un rouge vif, grandes - filets des étamines filiformes - stigmates 7-12, sur un disque lobé, à lobes se recouvrant par les bords - capsule courtement obovale, glabre. Plante polymorphe. |
| Écologie Champs et moissons, dans toute la France. |
| Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale et centrale ; Afrique septentrionale. |
| Floraison Mai-juillet. . |
| Usages Plante pectorale ; nuisible aux moissons. |

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

| | |
|---|---|
| Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux | |
| Formation végétale : thérophytaie | |
| Chorologie : européen | |
| Inflorescence : cyme unipare hélicoïde Fruit : capsule Couleur de la fleur : rose | sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : homogame Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore |


Description collaborative

Ceci est une **salade sauvage**. Pour plus d'informations, regardez [ici](#)


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|-----------------|--------------------|-----------------------|-------|
| fra | Coquelicot | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| spa | Ababol | | | |
| cat | Ababolera | | | |
| spa | Amapol | | | |
| spa | Amapola | | | |
| spa | Amapola común | | | |
| ita | Bambagelle | | | |
| deu | Blutblume | | | |
| eng | Common Poppy | | | |
| cat | Coquerecoc | | | |
| eng | Corn Poppy | | | |
| eng | Corn Rose | | | |
| eng | Corn-poppy | | | |
| deu | Feuer-Mohn | | | |
| eng | Field Poppy | | | |
| ndl | Grote Klapproos | | | |
| deu | Klatsch-Mohn | | | |
| deu | Klatschmohn | | | |
| cat | Màpola | | | |
| ita | Papavero comune | | | |
| cat | Pixallits | | | |
| eng | Red Poppy | | | |
| cat | Rosella vera | | | |
| ita | Rosolaccio | | | |
| cat | Vermelló | | | |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Présent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]MATHIEU Daniel - **Joli coquelicot, m'dame...** - 2000, p. 17- 17 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique du Vaucluse, 1, N°9
- [Botanique]SOUEGES René - **Un mode d'avortement du sac embryonnaire chez le Papaver Rhoeas L.** - 1926, p. 636- 640 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 73 - Fascicule 4
- [Botanique]SOUEGES René - **Développement de l'embryon chez le Papaver Rhoeas.** - 1928, p. 452- 469 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 75 - Fascicule 3

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|-----------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Ordre | Ranunculales | 101013 |
| Famille | Papaveraceae | 100912 |
| Genre | Papaver | 85382 |
| Espèce | Papaver rhoeas | 75277 |
| Forme | Papaver rhoeas f. rhoeas | 47843 |
| Forme | Papaver rhoeas f. strigosum | 82611 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Papaver strigosum* et code **1666** en tant que bis
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
 - le nom de *Papaver rhoeas* et code **0126**
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Papaver rhoeas* et code **0226**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Papaver rhoeas* et page **0094** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Papaver rhoeas* et code **0877** en tant que nom retenu