

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1143 <i>Potentilla verna</i> L.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace de 5-20 cm, verte, velue ou pubescente, à souche très rameuse - tiges latérales, faibles, étalées, dépassant peu ou point les feuilles, à poils ordinairement étalés-dressés - feuilles inférieures digitées, à 5-7 folioles obovales, velues, dentées dans le haut, à dent terminale plus petite - stipules radicales étroitement linéaires, les caulinaires lancéolées - fleurs jaunes, assez grandes, en cymes lâches pauciflores - pédoncules fructifères ascendants ou à peine courbés - calicule à lobes plus petits que ceux du calice - pétales émarginés, dépassant le calice - carpelles lisses. Plante polymorphe.
Écologie Lieux secs et arides, surtout calcaires, dans toute la France et en Corse.
Répartition Presque toute l'Europe ; Asie occidentale.
Floraison Mars-juin.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : européen septentrional	
Inflorescence : cyme unipare héliçoïde Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune Floraison : de mars à juin	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : apogame Dissémination : barochore

Description collaborative

Générale


3836 P. Neumanniana
 Rchb. foliis septenatis quinastique,
 foliolis obovatis in basin longe cu-
 neato-attenuatis superne incis, cau-
 libus decumbentibus filiformibus pe-
 tiolis pedunculisque arrecti-pilosis,
 calycis partitionibus ovato-lanceolatis,
 bracteolisque lineari-oblongis acutis.
 Rchb. pl. crit. X. ic. ... Media et
 forte hybrida inter vicinas: habitus
 fere P. opacae, indumentum P. patu-
 lae exiguum. Huc pertinere videtur
 P. opaca Sturm, quam propter folia
 characteristica primordialia pro more
 resecta, jam vituperarunt; nec propter
 indumentum alienum ad illam redu-
 cenda est, dentes foliolorum mali, nec
 calyx accuratus. In Böhmen am
 Rande der Strasse bei Benatek an son-
 nigen Orten in Lehmboden: Neu-
 mann, bei Dohna in der Gegend von
 Dresden : Bauer, Niederringelheim
 in der Pfalz: Ziz.

Identification


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Potentille de Neumann	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Potentille de printemps	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Potentille de Tabernaemontanus	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Potentille printanière	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Cinquefoglia primaticcia			
deu	Frühlings-Fingerkraut			
cat	Potentil·la vernal			
eng	Spring Cinquefoil			
ndl	Voorjaarsganzerik			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Rosales	102741
Famille	Rosaceae	101130
Genre	Potentilla	87050
Espèce	Potentilla verna	52953

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 *Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Potentilla neumanniana* et code **0965**
 - le nom de *Potentilla tabernaemontani* et code **0965** en tant que syn2
 - le nom de *Potentilla verna* et code **0965** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 *Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Potentilla neumanniana* et page **0345** en tant que nom retenu
 - le nom de *Potentilla tabernaemontani* et page **0345** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. *Flora gallica* sous :
 - le nom de *Potentilla tabernaemontani* et code **0990** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Potentilla verna* et code **0990** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. *Liste synonymique de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. *Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. *Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*

Autres

- Numéro du type : 52912