

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1222 Rosa rubiginosa L.
<ul style="list-style-type: none"> - Arbrisseau de 1 à 2 mètres, à port touffu, à tiges de l'année droites et raides - aiguillons inégaux, très crochus, souvent entremêlés d'acicules - feuilles à 5-9 folioles ovales-arrondies ou largement elliptiques, très glanduleuses en dessous, à dents peu profondes, composées-glanduleuses - fleurs d'un rose vif, assez petites, solitaires ou en corymbes - pédoncules assez longs, hispides-glanduleux - sépales allongés, glanduleux sur le dos, redressés et longtemps persistants sur le fruit, les extérieurs à appendices courts - stigmates en tête velue-hérissée - fruit médiocre.
Écologie Plaines et montagnes, de presque toute la France.
Répartition Europe presque entière, surtout centrale.
Floraison Juin-août.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Nanophanérophytes (2 à 4m) ()	
Formation végétale : nanophanérophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : corymbe Fruit : akène Couleur de la fleur : rose Floraison : de juin à août	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : endozoochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Églantier couleur de rouille	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Rosier à odeur de pomme	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Rosier rouillé	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Églantier de la Reine Elisabeth	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Rosier rubigineux	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
ndl	Egelantier			
ita	Rosa balsamina			
cat	Roser rubiginós			
deu	Schottische Zaubrose			
eng	Sweet-briar			
eng	Sweetbriar Rose			
deu	Wein-Rose			
deu	Weinrose			

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **1 juin 1848**
par **Herbier Pontarlier-marichal**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]MUGNIER Louis - **Rubigineuses hétéropodes**. - 1924, p. 304- 307 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 71 - Fascicule 2
- [Botanique]MUGNIER Louis - **x Rosa Friesiana R. Keller (R. pimpinellifolia < rubiginosa) dans l'Aube**. - 1927, p. 263- 264 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 74 - Fascicule 2

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

Rosa rubiginosa L. [1771, Mantissa Alt., 564]

Basionyme : Rosa rubiginosa L. [1771, Mantissa Alt., 564]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:38

Légende

Nom sélectionné

