

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|--|
| 2157 Scorzonera humilis |
| Synonymes <i>S. PLANTAGINEA</i> DC. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace à souche épaisse, dépourvue au collet de fibres chevelues - tige de 2-4 dm, dressée, fistuleuse molle, simple, monocéphale, rarement bi-trifurquée, glabre ou un peu cotonneuse au sommet - involucre à folioles extérieures bien plus courtes que les intérieures - feuilles glabres, entières, les radicales lancéolées ou lancéolées-linéaires, atténuées à la base, les caulinaires très peu nombreuses, étroites, sessiles - akènes longs de 9-10 mm, lisses ou un peu scabres - aigrette d'un blanc sale - fleurs jaunes plus longues que l'involucre. Varie, dans la région méditerranéenne, à fleurs petites, dépassant à peine l'involucre avec les feuilles caulinaires embrassantes (<i>S. PARVIFLORA</i> Jacq.). |
| Écologie Marais, prés et bois humides dans presque toute la France, plus rare dans le Midi. |
| Répartition Presque toute l'Europe. |
| Floraison Mai-juin. |

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

| | |
|--|---|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé | |
| Formation végétale : hémicryptophytaie | |
| Chorologie : européen | |
| Inflorescence : racème de capitules Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune Floraison : de mai à juin | sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore |


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|------------------------|-------------------|------------------------|--|
| fra | Petite Scorzonère | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Scorzonère des prés | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Scorzonère humble | Féminin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Scorzonère peu élevée | Féminin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Petite Scorzonère | Féminin singulier | Peu usité et à éviter | "Scorzonère" est une orthographe obsolète. |
| fra | Scorzonère des prés | Féminin singulier | Peu usité et à éviter | "Scorzonère" est une orthographe obsolète. |
| fra | Scorzonère humble | Féminin singulier | Peu usité et à éviter | "Scorzonère" est une orthographe obsolète. |
| fra | Scorzonère peu élevée | Féminin singulier | Peu usité et à éviter | "Scorzonère" est une orthographe obsolète. |
| deu | Böhmische-Scorzonere | | | |
| ita | Castracane | | | |
| eng | Dwarf Scorzonera | | | |
| eng | Dwarf Viper's Grass | | | |
| ndl | Kleine Schorseneer | | | |
| deu | Kleine Schwarzwurzel | | | |
| deu | Niedrige Schwarzwurzel | | | |
| ita | Scorzonera minore | | | |
| eng | Viper's-grass | | | |


Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Absent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **1 juin 1883**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Scorzonera humilis L. [1753, Sp. Pl., 2 : 790]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|--------------------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029 |
| Cladus | Asteridees | 102752 |
| Cladus | Campanulidees | 102761 |
| Ordre | Asterales | 102760 |
| Famille | Asteraceae | 100897 |
| Genre | Scorzonera | 87189 |
| Espèce | Scorzonera humilis | 61914 |
| Variété | Scorzonera humilis var. humilis | 168928 |
| Variété | Scorzonera humilis var. angustifolia | 168929 |
| Variété | Scorzonera humilis var. ramosa | 168930 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Scorzonera humilis* et code **2157**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Scorzonera humilis* et code **2290**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Scorzonera humilis* et code **4117**
 - le nom de *Scorzonera tenuifolia* et code **4118** en tant que bis
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Scorzonera humilis* et page **0751** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.